

Hoestdrank Mixtura Resolvens Livsane

Conform FNA

Lees deze patiëntinformatie zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit middel. Bewaar deze patiëntinformatie, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker. Dit middel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit middel niet door aan anderen.

SAMENSTELLING

Livsane Hoestdrank Mixtura Resolvens bevat per ml (= milliliter) 20 mg ammoniumchloride, 20 mg zoethoutwortel (drop) en 0,4 mg anijsolie.

Overige bestanddelen zijn: gezuiverd water en methylparahydroxybenzoesaat

WERKING EN/OF TOEPASSING

De in Livsane Hoestdrank Mixtura Resolvens aanwezige ammoniumchloride verdunt slijm en vergemakkelijkt het ophoesten ervan. Daarnaast heeft zoethoutwortel (drop) een verzachtende werking op de keel.

GEBRUIKELIJKE DOSERINGEN

Tenzij anders voorgeschreven, is de dosering:

Voor volwassenen: 3 tot 4 maal per dag 15 ml.

Voor kinderen: 3 tot 4 maal per dag 7,5 ml. U kunt hiervoor de bijgeleverde maatdosering gebruiken.

Schud voor gebruik de flacon goed om. Neem de drank bij voorkeur in met wat voedsel. Dit om misselijkheid te voorkomen.

Als u dit geneesmiddel een keer vergeet om in te nemen, moet u dit alsnog doen. Duurt het minder dan een uur voor u de volgende dosis weer mag innemen, sla dan de vergeten dosis over.

WANNEER BEGINT DE WERKING?

De werking begint vrijwel direct.

HOE LANG KAN IK DIT MIDDEL GEBRUIKEN?

Gebruik dit middel zo lang u klachten heeft of zo lang de arts voorschrijft.

Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen. Een normale hoest hoort binnen twee weken over te zijn. Als dit niet het geval is raadpleeg dan uw arts.

BIJWERKINGEN

Behalve de gewenste werking kan dit middel ook bijwerkingen geven.

Zelden:

- Misselijkheid. Dit kan meestal voorkomen worden door de drank met wat voedsel in te nemen. Bij aanhoudende maagklachten altijd contact opnemen met uw arts.
- Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. U kunt dit merken aan galbulten, huiduitslag en jeuk. Stop onmiddellijk met gebruik van de drank en geef door aan de apotheek waar u overgevoelig voor bent.

Bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden soms:

- Verhoging van de bloeddruk en vasthouden van vocht. Dit kunt u merken door bijvoorbeeld kortademigheid en/of dikke enkels.



Als u vermoedt, dat u te maken heeft met een bijwerking, die niet in deze bijsluiter staat, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

GEBRUIK MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

WANNEER NIET GEBRUIKEN?

U mag deze drank niet gebruiken, als u een ernstige lever- of nieraandoening heeft of wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op een van de bestanddelen.

Bij hoge bloeddruk of hartfalen mag de drank alleen gebruikt worden in overleg met uw arts.

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP

U kunt dit middel veilig gebruiken gedurende enkele dagen. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger zijn, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Wanneer u zwanger bent en een hoge bloeddruk heeft, overleg dan eerst met uw arts.

GEBRUIK BIJ BORSTVOEDING

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

TOEDIENINGSVORM

Drank

KLEUR

De drank is een bruine, ondoorzichtige vloeistof die nagenoeg vrij is van deeltjes, met de geur van anijs.

BEWAREN

De drank bij kamertemperatuur (beneden 25°C) bewaren, niet in de koelkast of vriezer.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Sluit de fles na gebruik goed af.

Voor gebruik de fles goed schudden.

Na openen 6 maanden houdbaar.

Uiterste gebruiksdatum en chargennummer: zie etiket.

Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw apotheker.

VERKRIJGBAARHEID

Dit middel is zonder recept exclusief bij de apotheek te verkrijgen.